

10 figyelmeztető jel, amely Primer Immundeficienciára (PI) utal

A Primer Immundeficiencia (PI) a gyermekeket és felnőtteket gyakran kiújuló vagy nehezen gyógyuló fertőzések megbetegedésekre hajlamosítja. Ha akár Ön, akár ismerőse egészségi állapotára az alább ismertetett figyelmeztető jelekből legalább kettő igaz, kérje orvosa véleményét a tünetek mögött lehetségesen meghúzódó immunhiányos betegséggel kapcsolatban.

1. Nyolcszor vagy többször előforduló fülgyulladás egy éven belül.
2. Két vagy több súlyos homlok- vagy orrmelléküreg-gyulladás egy éven belül.
3. Két vagy több hónapon át tartó, kevés eredménnyel járó antibiotikum-kezelés.
4. Két vagy több tüdőgyulladás egy éven belül.
5. Visszamaradt testi fejlődés (növekedés és súlygyarapodás).
6. Tályogok a bőrön vagy valamely szervben.
7. Tartós fekélyek a szájban egyéves kor után.
8. Intravénás antibiotikum-kezelés szükségessége a fertőzések leküzdéséhez.
9. Kétszer vagy annál többször előforduló súlyos fertőzés, pl. agyhártyagyulladás, csontvelőgyulladás, tüdőgyulladás vagy véráramfertőzés.
10. A családban halmozottan jelentkező immunhiányos megbetegedés.